

Parasitter og gødningsprøver



Heste

Som hesteejer er det vigtigt at holde øje med hestens indre sundhed. Parasitter (indvoldsorm) kan give nedsat præstation, utrivelighed og i værste fald alvorlig sygdom som kolik. For at behandle korrekt og undgå resistens mod ormekure, skal der altid lægges en strategisk plan baseret på gødningsprøver.

De 4 vigtigste parasitter hos hesten

- **Små strongylider (Cyathostomer):** Den mest almindelige indvoldsorm. Larverne overvintrer i tarmvæggen og kan ved massive udbrud om foråret give alvorlig diarré og vægttab
- **Store strongylider (Blodorm):** Den farligste orm. Larverne vandrer i hestens blodkar, hvilket kan stoppe blodtilførslen til tarmene og forårsage livsfarlig kolik
- **Bændelorm:** Sidder ofte i overgangen mellem tyndtarm og blindtarm. Kan forårsage forstoppelse og bændelormsinduceret kolik
- **Spolorm:** Ses primært hos føl og plage op til 2 års alderen. Kan give hoste, oppustet mave, utrivelighed og i værste fald tarmslyng

Hvornår er det bedst at teste?

For at få det mest præcise billede af smittetrykket, bør du teste din hest strategisk to gange om året:

- **Forår (April – Maj):** Før hestene lukkes på sommergræs. Dette minimerer smittetrykket på foldene. Her laves ofte en larvedyrkning for at tjekke for de farlige blodorm.
- **Efterår (September – Oktober):** Når græsnings sæsonen slutter. Dette viser, om hesten har optaget mange parasitter over sommeren og skal gå vinteren i møde med en ren tarm.

Symptomer du skal reagere på - Selvom mange heste ikke viser tydelige tegn på orm, bør du bestille en gødningsprøve, hvis du oplever:

- Mat og pjusket pels
- Vægttab eller manglende musklersætning
- "Ormemave" (oppustet bug)
- Tilbagevendende mild kolik eller løs afføring

Sådan opsamler du prøven korrekt - For at kunne give dig et pålideligt svar, skal prøven tages korrekt:

- **Friskhed** - Tag en helt frisk, lun pære direkte fra boksen eller folden (ønskes sandprøve indsamles fire stk.)
- **Renhed** - Undgå at få jord, sand eller halm med i posen
- **Pakning** - Pres luften ud af fryseposen og bind en tæt knude
- **Opbevaring** - Hold prøven kølig (i køleskabet, ikke fryseren) og aflever gødningsprøven inden for 24 timer

Resistens - findes der orm i gødningsprøven, så anbefales det at indlevere en ny gødningsprøve igen 14 dage efter behandling, for at sikre at behandlingen har haft effekt. Det anbefales desuden at læse mere om parasitter i denne folder fra Den Danske Dyrlægeforening

https://www.ddd.dk/media/11223/7081951_3-x-parasitfoldere_ejere_web_2.pdf

Parasitter og gødningsprøver



Heste

Udfyld inden indlevering af gødningsprøver

Hesteejers/staldejers oplysninger:

- Fulde navn:
- Adresse:
- Mailadresse:
- Telefonnummer
- CHR-nr.:
- Apotek:

	Hestens navn	Mikrochip	Race	Alder	Konsum
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Booking (LÆS MIG!) - I forbindelse med tidsbestilling skal der sendes en mail til kontakt@landvet.dk med en besked om, hvad henvendelsen drejer sig om samt med information om dit/dine kæledyr. **Husk** før end du har modtaget en bekræftelse på mail, så er tiden ikke booket.